

KİTAPÇIK TÜRÜ

B

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3. GRUP
ÇOCUK
ACİL

SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAN DAL SINAVI
22/08/2015

Adı ve Soyadı :
T.C. Kimlik No :

ALANLAR	SORU SAYISI	SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
Atama Yapılacak Görevin Niteliği	100	110

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Sınav saat **10.00**'da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk **30** dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. **Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz.** Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.
3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
7. Soru kitapçığının ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. **Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.**
9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
11. **Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.**

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

1. Kompartman sendromu gelişmiş olan bir çocukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Zaman hastanın aleyhine işlemektedir.
- B) Lokal enfeksiyonla mücadele ilk yapılacak işlemidir.
- C) Rijid fasyalarla çevrelenmiş kapalı alanın basıncı çok iyi değerlendirilmelidir.
- D) Gereksiz tahlillerle zaman kaybedilmemelidir.
- E) Dolaşım bozukluklarla birlikte olan bir durumdur.

2. Çocuklardaki femur boynu kırıkları ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Femur başı anatomisi sıklıkla etkilenir.
- B) Sıklıkla avasküler nekroz gelişmesi beklenir.
- C) Erken epifiz kapanması oluşur.
- D) Pes ekinovalgus deformitesi gelişebilir.
- E) Büyüme plağı hasarı ortaya çıkar.

3. Yenidoğan döneminde kız çocuklarda yaşamın ilk günlerinde görülebilen vajinal kanama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Anneden bebeğe geçen progesteronun etkisiyle olur.
- B) Anneden bebeğe geçen otoantiklorların etkisiyle olur.
- C) Anneden bebeğe geçen büyüme hormonunun etkisiyle olur.
- D) Anneden bebeğe geçen katekolaminlerin etkisiyle olur.
- E) Anneden bebeğe geçen östrojenin etkisiyle olur.

4. Preterm doğum için risk faktörlerinden yanlıs olan aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Daha önceki gebelikte preterm doğum öyküsü
- B) Maternal yaş (17 yaş altı veya 35 yaş üzeri)
- C) Yüksek sosyoekonomik düzey
- D) Çoğul gebelik
- E) Sigara, alkol

5. Yanık vakalarında mortaliteye etki eden faktörlerle ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yanığın derinliği
- B) Ailenin sosyoekonomik durumu
- C) Enfekte olup olmaması
- D) Hastanın yaşı
- E) Yanık yüzey alanı

6. Karın ağrısı yakınması ile hastaneye getirilen çocuk hasta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tedavinin tıbbi veya cerrahi olarak yönlendirilmesi en sona bırakılmalıdır.
- B) Karın ağrısının çeşitli etiyolojilerinin araştırılması ihmal edilmemelidir.
- C) İlk yaklaşımda "akut karın" ekarte edilmelidir.
- D) Karın ağrısının çeşitli türleri ve etiyolojileri iyi anlaşılmalıdır.
- E) Gereksiz tetkiklerle çok değerli olan zaman kaybedilmemelidir.

7. Boyun travmalı çocuk hastayla ilk karşılaşıldığında yapılması gerekenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Dolaşımı nasıl ona bakılır.
- B) Hava yolu açık mı bakılır.
- C) Boyun ve baş bölgesinde darbe izine bakılır.
- D) Sosyal güvencesine bakılır.
- E) Bilinç düzeyi değerlendirilir.

8. Beş yaş ve altındaki çocukların karşılaştığı kazalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kazaların % 51'i çocuğun kendi evinde iken olduğu saptanmıştır.
- B) Kazaların % 61'i çocuğun kendi evinde iken olduğu saptanmıştır.
- C) Kazaların % 71'i çocuğun kendi evinde iken olduğu saptanmıştır.
- D) Kazaların % 81'i çocuğun kendi evinde iken olduğu saptanmıştır.
- E) Kazaların % 91'i çocuğun kendi evinde iken olduğu saptanmıştır.

9. Rabdomiyoliz nedir?

- A) Sadece miyokard hasarını ifade eden bir terimdir.
- B) Crush sendromu gelişen hastada akut böbrek yetmezliği gelişmesidir.
- C) Genel travma hastasına uygulanan periton diyalizidir.
- D) Çizgili kas hücrelerinin parçalanması ve içinde bulunan maddelerin dolaşıma geçmesidir.
- E) Eritrositlerin hızlı bir şekilde yıkılmasıdır.

10. Çocuklarda Reye Sendromuna yol açabilecek ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Parasetamol
- B) Asetil salisilik asit
- C) Asetil salisilik asit + İbuprofen
- D) Parasetamol + Asetil salisilik asit
- E) İbuprofen

11. Çocuklarda süt dişlerinin sayısı alt çenede ve üst çenede olmak üzere toplam kaç tanedir?

- A) Alt çenede ve üst çenede 10 + 10 toplam 20 tane
- B) Alt çenede ve üst çenede 8 + 10 toplam 18 tane
- C) Alt çenede ve üst çenede 8 + 8 toplam 16 tane
- D) Alt çenede ve üst çenede 10 + 8 toplam 18 tane
- E) Alt çenede ve üst çenede 12 + 12 toplam 24 tane

12. Ani bebek ölümü sendromu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Doğumunda solunumun durması ve canlandırma işlemi yapılmış olması ile ilişkili değildir.
- B) Uyuşturucu kullanan annelerin bebekleri risk altındadır.
- C) Annenin sigara kullanımı ile yakından ilişkilidir.
- D) Düşük doğum kilolu olarak dünyaya gelmiş bebeklerde daha sıktır.
- E) Aynı nedenle ölmüş bir bebeğin kardeşi olması bir risk faktörüdür.

13. Yenidoğan döneminde “apne” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Apne merkezi apne, obstrüktif apne veya ikisi birlikte olabilir.
- B) Apne obstrüktif apne ise solunum çabaları dikkat çekicidir.
- C) En sık görülen prematüre apnesidir.
- D) Apne merkezi apne ise solunum sayısının da takipneik olması beklenir.
- E) Apne yenidoğan döneminde kesinlikle normal bir bulgu değildir.

14. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda akut gastroenterite bağlı dehidratasyonun yol açtığı hipovolemik şok belirtilerinden değildir?

- A) Taşikardi
- B) Cilt turgor ve tonusunda bozulma
- C) İdrar çıkışında ciddi azalma
- D) Bilinç düzeyinde bozulma
- E) Terleme, nemli cilt

15. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda tek başına olduğunda kısmi hava yolu tıkanıklığının belirtisi değildir?

- A) Whizzing
- B) İnterkostal çekilmeler
- C) Suprasternal çekilmeler
- D) Stridor
- E) Siyanoz

16. Yenidoğan dönemindeki bir bebek için dakikadaki nabız sayısının 100/dakikanın altında olması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

- A) Taşikardi B) Sinüzal aritmi
C) Bradikardi D) Paradoks nabız
E) Filiform nabız

17. Dobutamin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kalp hızını artırır.
B) Akciğer ödeme neden olur.
C) Pozitif inotropik etkisi vardır.
D) Sentetik bir katekolamindir.
E) Taşikardiye, taşiaritmiye ve ektopik atımlara neden olabilir.

18. Bir çocuk hastada aşağıdakilerden hangisi akciğer embolisi için herediter risk faktörü değildir?

- A) Antitrombin III. eksikliği
B) Protein C eksikliği
C) Protein S eksikliği
D) Faktör V. (Leiden faktör) eksikliği
E) Faktör XIII. eksikliği

19. Bir çocuk hastada üst solunum hava yolu tıkanıklığı ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Çocuk hastalarda sıklıkla serum N-Terminal pro BNP düzeyleri düşüktür.
B) Üst solunum hava yolu tıkanıklığı alveolarhipoksiye neden olur.
C) Pulmoner arter basıncında ciddi yükselmelere neden olabilir.
D) Akut tonsillofarenjit en sık hava yolu tıkanıklığı nedenlerinden biridir.
E) Üst solunum hava yolu tıkanıklığı kalp ve dolaşım sistemini de kısmen etkiler.

20. Çocuklarda görülen ve öksürük özelliği ile kolayca tanı konulabilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Boğmaca B) Bronkopnömoni
C) Astım D) Bronşit
E) Akciğer tüberkülozu

21. Anafilaksi tablosu ile gelen bir çocukta; belirgin solunum sıkıntısı ve şok bulguları ile birlikte hava yolu ödemi bulguları varlığında uygulanacak ilk ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Adrenalin B) Antihistaminikler
C) İzotonik Solüsyonlar D) Kortikosteroidler
E) Salbutamol

22. Çocuklarda üst solunum hava yolu tıkanıklığı yapan nedenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Allerjikrinit B) Pulmoner hipertansiyon
C) Adenoid vejetasyon D) Akut tonsillofarenjit
E) Trakeomalazi

23. Çocuklarda görülen hangi doğuştan kalp hastalığında enfektif endokardit profilaksisine gerek yoktur?

- A) Fallot Tetralojisi B) Mitral Yetmezlik
C) Pulmoner Darlık D) Sekundum ASD
E) Trunkusarteriyozus

24. Adrenalin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Dakikadaki kalp hızını artırır.
B) Kalbe dönen kan miktarını artırır.
C) Kontraksiyonları uyarır ve bradikardi oluşturur.
D) Kan basıncını azaltır.
E) Pozitif inotropik etkisi vardır.

25. Çocuklarda akut romatizmal ateşle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi minör Jones kriteri değildir?

- A) ASO titrasyonunun yüksek olması
- B) CRP yüksekliği
- C) Eritrosit sedimentasyon hızının yüksek olması
- D) EKG'de PR aralığının uzaması
- E) Artralji

26. Doğumundan sonra 6 saat geçtiği hâlde düzelmeyen siyanozu olan bir bebekte çekilen akciğer grafisinde yumurta şeklinde ve büyük bir kalp ve üst mediasteninin daralmış olduğu görülüyor. Muhtemel tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Büyük arterlerin d-transpozisyonu
- B) Hipoplastik sol kalp sendromu
- C) Pulmoner atrezi
- D) Atriyoventriküler septal defekt
- E) Kesintili arkus aorta

27. Çocuklarda görülen hangi tür göğüs ağrısı ciddi bir nedene bağlı olabileceğine işaret eder?

- A) İstirahat hâlinde iken ortaya çıkan göğüs ağrıları
- B) Taşikardi ile birlikte olan göğüs ağrıları
- C) Sınav stresi gibi durumlarda ortaya çıkan göğüs ağrıları
- D) Çok kısa sürede geçen göğüs ağrıları
- E) Kendiliğinden geçen göğüs ağrıları

28. Aşağıdakilerden hangisi Nabızsız Elektriksel Aktivite nedenlerinden birisi değildir?

- A) Hipoksi
- B) Metabolik bozukluklar
- C) Hipotermi
- D) Hipo/hiperpotasemi
- E) Hipovolemik şok

29. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik hematüriye neden olmaz?

- A) Henochschonlein purpura vaskülit
- B) Vezikoüreteral reflü
- C) İdrar yolu enfeksiyonları
- D) Aşırı egzersiz durumları
- E) Nörojen mesane

30. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda nefrotik sendrom için proteinüri sınırındır?

- A) 4 mg/m²/saat
- B) 10 mg/m²/saat
- C) 25 mg/m²/saat
- D) 40 mg/m²/saat
- E) 250 mg/m²/saat

31. Akut böbrek yetmezliği olan bir çocukta acil diyaliz endikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Serum pH değerinin 7,2'nin altına inmesi
- B) Serum sodyum düzeyinin 140 mEq/l'te üzerine çıkması
- C) Vücut ağırlığının iki misline çıkması
- D) Serum potasyum düzeyinin 7,5 mEq/l'te üzerine çıkması
- E) Serumbikarbonat düzeyinin 15 mEq'l'nin üzerine çıkması

32. ESWL işlemi ne demektir?

- A) Şok dalga litotripsi işlemi ile böbrek taşının küçük parçalara ayrılması işlemidir.
- B) Laser ışınları ile böbrek taşının küçük parçalara ayrılması işlemidir.
- C) Yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ile üriner sisteminin görüntülenmesidir.
- D) Ultrason dalgaları ile üriner sisteminin görüntülenmesidir.
- E) Yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar yardımı ile böbrek taşının küçük parçalara ayrılması işlemidir.

33. Yenidoğan döneminde sistemik hipertansiyon için en sık neden aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Renalventrombozu
- B) Aort koarktasyonu
- C) Renal arter trombozu
- D) Bronkopulmoner displazi
- E) Esansiyel hipertansiyon

34. İdrar kokusu ile metabolik hastalık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Fare idrarı kokusu → Klasik fenilketonüri
- B) Akçaağaç şurubu kokusu → MSUD
- C) Terli ayak → İzovaleirik asidemi
- D) Kedi idrar → 3-Metilkrotonilglisinüri
- E) Balık kokusu → Tirozinemi

35. Doğuştan metabolik hastalıklardan hangisi metabolik asidozla seyreder?

- A) Nonketotik hiper glisinemi
- B) Sülfidoksidad eksikliği
- C) Organik asidüriler
- D) Üre siklus defektleri
- E) Fenilketonüri

36. İdrarda redüktan madde pozitifliği olmayan metabolik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Galaktozemi
- B) Fruktozintoleransı
- C) Tirozinemi tip I
- D) Laktik asidemiler
- E) Fanconisendromu

37. Yağ asidi oksidasyon bozukluklarının en ayırıcı bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hipoglisemi
- B) Keton yokluğu
- C) Kardiyomiyopati
- D) Kas güçsüzlüğü
- E) Koma

38. Çocukluk döneminde demir eksikliği anemisi ile ilişkili olduğu rapor edilen aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tortikolis
- B) Katılma Nöbetleri
- C) Akut İmmun Polinöropatiler
- D) Akut Nöromusküler Güçsüzlük
- E) Kranial Sinir Fonksiyon Bozuklukları

39. Çocukluk döneminde görülen tüberküloz menenjitte ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tüberkülozun ağır formlarından biridir.
- B) Sinsi seyirlidir.
- C) BOS proteini çok yüksek bulunur.
- D) İlerleyen durumlarda bilinç bozukluğu başlar.
- E) Kranial sinir tutulumu beklenmez.

40. Çok değişik klinik bulgularla ve oldukça değişken patofizyolojik, anatomik ve etyolojik temele dayalı, 30 dakika veya daha uzun süren epileptik etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Febril konvülsiyon
- B) Akut inme sendromu
- C) Status epileptikus
- D) Migren nöbeti
- E) Kranial sinir fonksiyon deşarjı

41. Çocukluk döneminde görülen senkopla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Baş dönmesi ile başlar.
- B) Birlikte bulantı hissi vardır.
- C) Kısa süreli bradikardi ve hipotansiyon olur.
- D) En sık görülen tipi hipovolemik senkoptur.
- E) Uzun süreli bilinç kaybı beklenen bir bulgu değildir.

42. Çocukluk döneminde en sık karşılaşılan anemi türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akdeniz anemisi
- B) Hemolitik anemi
- C) Demir eksikliği anemisi
- D) Orak hücreli anemi
- E) Megaloblastik anemi

43. Çocukluk döneminde akut lenfoblastik lösemi komplikasyonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gastrointestinal kanama bazen abondan olabilir.
- B) Malign perikardiyal effüzyon en sık görülen komplikasyonlardan birisidir.
- C) Ataksi santral sinir sistemi tutulumunu gösterir.
- D) Testiste ağrısız şişlikler beklenen bir bulgudur.
- E) Nekrotizan enterokolit nadiren görülür.

44. Çocukluk döneminde “hafif” febril nötropeni sınır değerleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Mutlak nötrofil sayısının mm^3 te 1500'ün altına inmesi durumudur.
- B) Mutlak nötrofil sayısının mm^3 te 1000'in altına inmesi durumudur.
- C) Mutlak nötrofil sayısının mm^3 te 500'ün altına inmesi durumudur.
- D) Mutlak nötrofil sayısının mm^3 te 250'nin altına inmesi durumudur.
- E) Mutlak nötrofil sayısının mm^3 te 150'nin altına inmesi durumudur.

45. Çocukluk döneminde batında kitle en sık aşağıdakilerden hangi nedene bağlı gelişir?

- A) Rabdomyosarkom
- B) Miksoma
- C) Wilms tümörü
- D) Nöroblastom
- E) Lenfoma

46. Sağlıklı çocuklarda trombosit sayısı normalde ne kadardır?

- A) 15,000 ile 45,000 / mm^3 arasında değişir.
- B) 100,000 / mm^3 tür.
- C) 120,000 / mm^3 tür.
- D) 150,000 ile 250,000 / mm^3 arasında değişir.
- E) 150,000 ile 450,000 / mm^3 arasında değişir.

47. Uzamış sarılık yakınması ile getirilen 2 aylık bir bebekte direkt hiperbilirubinemi belirleniyor. Kolestaz açısından en önemli muayene bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Karında assit bulunması
- B) Bir cm splenomegali olması
- C) Koyu renkte idrar çıkarması
- D) İki cm hepatomegali olması
- E) Dışkıının akolik olması

48. Yenidoğan döneminde sindirilmemiş besinlerin kusulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Peptik ülser
- B) Özofagus atrezisi
- C) Pilonstenozu
- D) Özofagus varisleri
- E) Ampulla distalinde duodenal tıkanıklık

49. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk döneminde peptik hastalığa veya malign mide tümörlerine yol açabilir?

- A) Campylobacter jejuni
- B) Giardia intestinalis
- C) Helicobacter pylori
- D) Parvovirus B 19
- E) Herpes virüs tip 2

50. On beş günlük sağlıklı görünümlü bir bebekte 3 günden beri fışkırır tarzda kusmalar ortaya çıkıyor. Öncelikle düşünülmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Doğuştan hipertrofik pilor stenozu
- B) Özofagus varisleri
- C) Hiatus hernisi
- D) Akut gastroenterit
- E) Çölyak hastalığı

51. Çocukluk döneminde A hepatit tanısı alan bir hastanın hastaneye yatışına gerek olup olmadığına karar vermek için bakılması gereken test aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alkalen fosfataz
- B) INR
- C) Kanama zamanı
- D) HBsAg
- E) Karaciğer enzimleri

52. Çocukluk döneminde kabakulak tanısı ile izlenmekte olan hastada karın ağrısı başlıyor. Bakılması gereken enzim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Laktaz
- B) G6P Dehidrogenaz
- C) Lipaz
- D) Alkalenfosfataz
- E) Transaminazlar

53. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı kalıcı hipoglisemi nedenlerinden birisi değildir?

- A) Galaktozemi
- B) Glikoz-6-fosfotaz eksikliği
- C) Addison hastalığı
- D) Diyabetik anne bebeği
- E) Hiperinsülinemik hipoglisemi

54. Diyabetik ketoasidozda bikarbonat tedavisi için kan pH kaç olmalıdır?

- A) <7,25
- B) <7,20
- C) <7,15
- D) <7,10
- E) <7,00

55. Aşağıdakilerden hangisi adrenal yetmezlik bulguları arasında yer almaz?

- A) Hipopigmentasyon
- B) Hipotansiyon
- C) Hipoglisemi
- D) Hiperkalsemi
- E) Hiponatremi

56. Raşitizm tedavisinde düşük doz uzun süreli oral tedavide vitamin D dozu yaklaşık ne olmalıdır?

- A) 400 Ü/gün
- B) 800 Ü/gün
- C) 1500 Ü/gün
- D) 2500 Ü/gün
- E) 3000 Ü/gün

57. Tiroid krizi tedavisinde yeri olmayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hidrasyon
- B) Antiroid ilaçlar
- C) İyot tedavisi
- D) Antihipertansif
- E) Beta blokör

58. Çocukluk döneminde tonsillit ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Streptokoksik tonsillit sonrası akut romatizmal ateş gelişebilir.
- B) Tonsilliller hipertrofi sonrası alveolar hipoksi gelişir.
- C) Tonsilliller hipertrofi çocuklarda çene gelişimini olumsuz yönde etkiler.
- D) Benzatin penisilin G profilaksisinin atak sayısını azalttığı gösterilememiştir.
- E) Kriptik tonsillitte sebep genellikle stafilokoklardır.

59. Çocukluk döneminde kızamık aşısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Bebek doğar doğmaz ilk doz yapılır.
- B) Üçlü kızamık aşısı (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) bir yaşında yapılır.
- C) Salgın olan beldelerde 2., 4. ve 6. aylarda yapılır.
- D) İkinci tekrarına (rapel) gerek yoktur.
- E) Annede kızamık antikorları varsa bebeğe aşı yapılmaz.

60. Çocukluk döneminde tüberküloz menenjitte beyin omurilik sıvısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Lenfo-mononükleer hücreler yaymada hakimdir.
- B) Protein yüksektir.
- C) Glikoz seviyesi düşüktür.
- D) Klorür seviyesi düşüktür.
- E) Bulanık renklidir.

61. Çocukluk döneminde salmonella enfeksiyonunun bulaşma yolu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fekal oral kontaminasyon
- B) Hematojen
- C) Lenfojen
- D) Öksürükle
- E) Doğrudan temas ile

62. Çocukluk döneminde gastroenterite bağlı gelişen dehidratasyon aşağıdaki hangi hastalıkta ciddi sorun oluşturabilir?

- A) Hipotroidi
- B) Fallot tetralojisi
- C) Hemolitik anemi
- D) Lösemi
- E) Adenotonsiller hipertrofi

63. Çocukluk döneminde aşağıda görülen hangi hastalık kenelerle bulaşır?

- A) Lyme hastalığı
- B) Toksoplazma
- C) Trişinozis
- D) Difteri
- E) Sıtma

64. Aşağıdaki bulgulardan hangisi Kawasaki hastalığının tanı kriterlerinden birisi değildir?

- A) Bilateral purulan olmayan konjunktival enfeksiyon
- B) Orofarinkste difüz eritem, çilek dili, dudaklarda kırmızılık
- C) El ve ayaklarda ödem, eritem, deskuamasyon
- D) Servikal lenfadenopati
- E) Mezokardiyak odakta pansistolik üfürüm

65. Çocukluk döneminde MEFV geni hangi hastalığın genetik bulgusudur?

- A) Sistemik Lupus
- B) Kawasaki
- C) Ailesel Akdeniz Ateşi
- D) Romatoid Artrit
- E) Skleroderma

66. Çocuklarda görülen post streptokoksik reaktif artrit ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Semptomlar akut romatizmal ateşten daha erken dönemde başlar.
- B) Salisilat tedavisine cevap iyi değildir.
- C) ASO titrasyonu yüksek olması beklenir.
- D) Sekonder profilaksi gerekmez
- E) Akut romatizmal ateşe göre daha selim seyirlidir.

67. Akut romatizmal ateşte en sık görülen kapak tutulumu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pulmoner darlık B) Aort darlığı
C) Mitral darlığı D) Aort yetmezliği
E) Mitral yetmezlik

68. Bebeklerde diaper dermatit ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Çocuk bezinin altında kalan bölgede nem, friksiyon, üre gibi faktörlerin etkisiyle gelişir.
B) Tedavinin en önemli iki amacı zedelenmiş derinin iyileşmesini hızlandırmaktır.
C) Bakteriyel ve fungal ajanlara yönelik tetkikler inatçı vakalarda yapılmalıdır.
D) Ülkemizde bebeklerin % 7-35'inde görülmektedir.
E) Genellikle de 2-3. yaşlarda sıklıkla gelişir.

69. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan dönemindeki kandida enfeksiyonları için risk faktörlerinden değildir?

- A) Doğum şekli
B) Uzun süreli kateter kullanımı
C) Steroid kullanımı
D) İmmün yetmezlik
E) Parenteral beslenme

70. Molluskum Kontagiosum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Sebebi koksaki virüstür.
B) Pox virüs ailesinden bir virüstür.
C) Sebebi HIV virüsüdür.
D) ECHO virüs ailesindendir.
E) Holovirüs ailesinden bir virüstür.

71. Çocukluk döneminde haşlanmış deri sendromu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Haşlanmış deri sendromu viral bir cilt hastalığıdır.
B) Streptokokların streptolizin enzimleri ile oluşur.
C) Kontakt dermatittir.
D) S. Aureus'un eksfoliyatif toksini ile ilişkili bir tablodur.
E) Yenidoğan döneminde ve küçük bebeklerde sıklıkla görülür.

72. Çocuklarda Lyme hastalığında görülen döküntü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eritema nodozum B) Eritema multiforme
C) Eritema migrans D) Fasiyal eritema
E) Eritema marginatum

73. Aşağıdakilerden hangisi anne sütünün kontrendike olduğu durumlardandır?

- A) Anne sütü sarılığı B) İnek sütü alerjisi
C) Galaktozemi D) Kongenital hipotiroidi
E) Kistik fibrozis

74. Yenidoğan dönemindeki boğmaca için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Hastalığın etkeni bordetella pertussistir.
B) Bulaşma hematogen yolla olur.
C) Boğmaca bu yaş grubunda ağır seyirlidir.
D) Her biri yaklaşık 2 hafta süren kataral, paroksizmal ve nekahat dönemi olmak üzere 3 evre gösterir.
E) Erken evrede başlanan antibiyotik tedavisi semptomları azaltır, bulaştırıcılığı önler.

75. Aşağıdakilerden birisi yenidoğan döneminde doğum travmalarından değildir?

- A) Sefal hematoma B) Kaput suksadeneum
C) Tortikolis D) Klavikula kırıkları
E) Bell paralizi

76. Yenidoğan döneminde yapılan aşağıdaki hangi test siyanozun kardiyak olup olmadığını açıklamada yararlıdır?

- A) Kan pH değeri B) Kan şekeri düzeyleri
C) Kan gazları D) Oksijen inhalasyonu
E) Bebeğin ısıtılması

77. Yenidoğan döneminde genital muayene sırasında saptanan hangi bulgu acil cerrahi gerektirebilir?

- A) Boş skrotum B) Mikropenis
C) Testis torsiyonu D) Fimozis
E) Hidrosetel

78. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan döneminde pulmoner hipertansiyon nedenlerinden biridir?

- A) Pulmoner atrezi
B) Respiratuvar distres sendromu
C) Fallot tetralojisi
D) Uzamış sarılık
E) Kritik pulmoner darlık

79. Yenidoğan döneminde impetigo için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yüz ve boyundaki cilt enfeksiyonlarıdır.
B) Santral sinir sisteminin enfeksiyöz bir hastalığıdır.
C) Sebep daha çok E.Coli'dir.
D) Hematojen yolla bulaşır.
E) Staf Aureus'un neden olduğu akciğer enfeksiyonudur.

80. Aşağıdakilerden hangisi uzamış sarılık nedenlerinden birisi değildir?

- A) Damar dışında kan birikimi, hematoma
B) Konjenital hipotiroidi
C) Turner sendromu
D) Crigler najjar sendromu
E) Konjenital pilor stenozu

81. Yenidoğanın fizik muayenesinde bakılan yenidoğan refleksleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Emme refleksi B) Yutma refleksi.
C) Yakalama refleksi D) Patella refleksi
E) Moro refleksi

82. Yenidoğan geçici takipnesinin doğru tanımlaması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Doğumdan önce anne karnındaki bebeğin akciğerlerinin sıvı ile dolu olmasıdır.
B) Bebeğin anne karnında akciğerlerini kullanamaması durumudur.
C) Doğum sonrası akciğerlerdeki sıvının atılması ile oluşan geçici takipnedir.
D) Doğumdan sonraki ilk 6 saat içinde gerçekleşen herhangi bir nedene bağlı takipnedir.
E) Bebeğin ihtiyacı olan oksijeni göbek kordonu kanalıyla almasıdır.

83. Yenidoğan döneminde göbek bağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Göbek bağı temiz ve kuru tutulmalıdır.
- B) Göbek bağı bebeğin cildinden yaklaşık 1,5-2 cm yukardan kesilmelidir.
- C) Göbek bağı düştükten sonra gelişen ısrarcı kanamalar anlamlı olabilir.
- D) Kimi bebeklerde düşme sırasında az miktarda kanama görülebilir.
- E) Göbeğin çabuk düşmesini sağlamak amacıyla krem ve pomat kullanılmalıdır.

84. “Amanita Muscarina” için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Bir bakteri türüdür.
- B) Bir zehirli mantar çeşididir.
- C) Bir virüs türüdür.
- D) Bir parazittir.
- E) Bir bitkidir.

85. Çocukluk döneminde Organofosfat toksisitesinde muskarinik etkilerin antidotu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Atropin
- B) Adrenalin
- C) Asetaminofen
- D) Salisilatlar
- E) Kaptopril

86. Çocukluk döneminde salisilat zehirlenmesi için serum salisilat tehlike sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Plazma değeri 2-2,5 mg/L
- B) Plazma değeri 5-10 mg/L
- C) Plazma değeri 20-25 mg/L
- D) Plazma değeri 200-250 mg/L
- E) Plazma değeri 500 mg/L ve üzeri

87. Çocukluklarda amitriptilinin entoksikasyonunda ilacın yarılanma ömrü ne kadardır?

- A) 7-10 gündür.
- B) 3-4 gündür.
- C) 24-48 saat arasında değişmektedir.
- D) 12 saatin altındadır.
- E) Alınan doza göre 24-100 saat arasında değişir.

88. Çocukluk döneminde trisiklik antidepresan zehirlenmesi (TSA) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) TSA ilaçların antidotu adrenalindir.
- B) Sodyum bikarbonatın ventriküler aritmileri önlenmede yararı gösterilmiştir.
- C) Kalpte ileti bozuklukları varsa risk daha da yüksektir.
- D) Acil olarak tedaviye başlanılmalıdır.
- E) TSA zehirlenmelerinde mortalite çok yüksektir.

89. Çocukluk döneminde beta bloker ilaçlarla oluşan zehirlenmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Çok ağır seyredabilen zehirlenmelerdir.
- B) Atriyoventriküler iletide azalma yaparlar.
- C) Yaşamı tehdit edebilecek bradikardi gelişebilir.
- D) Çoğu zaman diürez sağlanması yeterli olur.
- E) Tam donanımlı çocuk yoğun bakım birimlerinde izlenmelidir.

90. Çocuklarda akrep sokmalarında nörolojik tutulumu gösteren bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ağrı
- B) Ödem
- C) İltihaplanma, kızarma, morarma
- D) Adale krampları, titreme ve karıncalanma
- E) Havale

91. Aşağıdakilerden hangisi karbonmonoksit zehirlenmesinin klinik bulgularından değildir?

- A) Baş ağrısı
- B) Güçsüzlük ve hâlsizlik
- C) Sistemik hipertansiyon
- D) Bulantı, kusma
- E) Bulanık görme

92. Aşağıdakilerden hangisi yüksek ortam beyin ödeminin klinik bulgularından değildir?

- A) Adalelerde uyum bozukluğu (ataksi)
- B) Ciddi hipotermi
- C) Parestezi (duyu kaybı)
- D) Şiddetli baş ağrısı
- E) Zihinsel donukluk (düşünme zorluğu)

93. Çocuk acil polikliniklerinde “psikiyatrik nedenli acil başvuru” sayıları dikkate alındığında, adolesan yaş grubundaki çocukların oranı ne kadardır?

- A) % 2-3
- B) % 5-10
- C) % 25
- D) % 75-80
- E) % 90 ve üzeri

94. Çocukluk döneminde en sık karşılaşılan doğuştan diyafragma hernisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Morgagnihernisi
- B) Diyafragmanın sol posterolateral bölgesinde Bochdalek hernisi
- C) Diyafragmanın posteriyorunda sağda olan herniler
- D) Sağ akciğer hipoplazisi ile birlikte olan herniler
- E) Değişik sendromlarla birlikte olanlar

95. Mekonyumileusu aşağıdaki durumlardan hangisinde en sık görülür?

- A) Kistikfibrozis olan yenidoğan
- B) Doğuştan pilorstenozu
- C) Duodenal atrezi
- D) Nekrotizan enterokolit
- E) Hiatus hernisi

96. Aşağıdakilerden hangisi Cantrell pentalojisini oluşturan malformasyonlarından biri değildir?

- A) Diyastazisrekti veya Omfalosel
- B) Diyafragmatikperikard
- C) Ön diyafram gelişimsel bozuklukları
- D) Ansefalosel
- E) Doğustan kalp hastalığı

97. Gözyaşı boşaltım yolu tıkanıklığının tedavisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tekrarlayan göz enfeksiyonları tedavi sonrası kaybolur.
- B) Gözyaşı yolları tıkanıklığının tedavisi cerrahidir.
- C) Gözyaşı kesesi ile burun boşluğu arasında yeni bir yol oluşturulur.
- D) Tedavi sonrasında hastaların gözyaşı drenajı düzelir.
- E) Çocuklarda gözyaşı boşaltım yolu tıkanıklığı varsa bir süre ilaç tedavisi denenmelidir.

98. Çocukluk döneminde en sık karşılaşılan periferik fasiyal paralizi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İdiopatikfasiyal paralizi
- B) Santral fasiyal paralizi
- C) Erb-Duchene paralizi
- D) İnme (strok) bağlı fasiyal paralizi
- E) Travmatik fasiyal paralizi

99. Çocukluk döneminde orşite neden olan aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Toksoplazma B) Kabakulak
C) Kızıl D) Kızamık
E) Menenjit

100. Hidrosefali nedeni ile şant takılmış çocuklarda sepsis gelişirse nasıl hareket edilir?

- A) Şant hemen çıkartılır.
B) Antibiyotik tedavisine başlanır, şanta dokunulmaz.
C) Kültür antibiyogram sonucuna göre antibiyotik başlanır, şanta dokunulmaz.
D) LP yapılır, normalse sadece geniş spektrumlu bir antibiyotik başlanır, şanta dokunulmaz.
E) LP yapılmaksızın menenjit kabul edilir ve tedaviye başlanır, şanta dokunulmaz.

**TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.**

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmamak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

- Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz.
- Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
- Başlama zilini bekleyiniz.
- Hepinize başarılar dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

22 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE YAPILAN
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAN DAL SINAVI
3. GRUP: ÇOCUK ACİL
B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1. B	26. A	51. B	76. D
2. D	27. B	52. C	77. C
3. E	28. E	53. D	78. B
4. C	29. B	54. E	79. A
5. B	30. D	55. A	80. C
6. A	31. D	56. C	81. D
7. D	32. A	57. D	82. C
8. E	33. C	58. E	83. E
9. D	34. E	59. B	84. B
10. C	35. C	60. E	85. A
11. A	36. D	61. A	86. D
12. A	37. A	62. B	87. E
13. D	38. B	63. A	88. A
14. E	39. E	64. E	89. D
15. E	40. C	65. C	90. E
16. C	41. D	66. D	91. C
17. B	42. C	67. E	92. B
18. E	43. B	68. E	93. D
19. A	44. A	69. A	94. B
20. C	45. D	70. B	95. A
21. A	46. E	71. D	96. C
22. B	47. E	72. C	97. E
23. D	48. B	73. A	98. C
24. C	49. C	74. B	99. B
25. A	50. A	75. E	100. A