



- *Primer PCI (p-PCI) yapabilen servisler 7/24 hizmet verebilmelidir. Bu servislerde p-PCI uygulaması; merkeze ulaşan vakaya 60 dakika içerisinde p-PCI başlayabilecek durumda olmalıdır.*
- *İlk tıbbi temastan (İTT) sonra 120 dakika içerisinde p-PCI uygulaması mümkün ise p-PCI uygulaması, değil ise dahiliye ve/veya kardiyoloji uzman hekimlerince fibrinolitik tedavi uygulanmalıdır.*
- *Fibrin spesifik ajanlar, fibrin spesifik olmayan ajanlara göre birinci planda önerilir.*
- *Fibrinoliz uygulaması sonrası tüm hastalar bir PCI merkezine gönderilmelidir.*

Bu bağlamda;

“Reperfüzyon Stratejisi için Temel Önerilerin” sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulması,

Söz konusu uygulama için gerekli tedbirlerin alınarak organizasyonun sağlanması, hususlarında gereğini ve bilgilerinizi arz/rica ederim.

**Prof. Dr. İrfan Şencan**  
**Bakan a.**  
**Müsteşar Yardımcısı V.**

**DAĞITIM:**

**Gereği:**

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu  
Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı  
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)

**Bilgi:**

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  
Türk Kardiyoloji Derneği  
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

---

Sağlık Hizmetleri Planlama Daire Başkanlığı

N  tpaşa Cad. No:3 B Blok 2.Kat No:17 Sıhhiye / ANKARA