

Solunum Sıkıntısı veya
Takipne veya
SPO₂ < %93 veya
Taşikardi

VAR

YOK

Belirlenen Servise Yatış*

Komorbid Hastalık veya
Yaş>50

VAR

YOK

Tam Kan,
CRP
+
PA Akc veya BT**

Tam Kan CRP, Biyokimya
Kan Gazı, D-Dimer
PA Akc veya BT**

Ağır pnömoni bulguları

Normal veya hafif pnömoni bulguları

Belirlenen Servise Yatış*

Test (PCR)

Sonuç çıkana kadar
Evde izolasyon ve Takip

Ampirik Tedavi: Oseltamivir¹ + Hidroksiklorokin² ± Antibiyotik

Test sonucu

Negatif

Pozitif

Hastalık Bulguları

Hidroksiklorokin³ başlanır
Evde tedavi kurallarına
göre takip edilir

Test (PCR)

Negatif

Pozitif

Ampirik Tedaviyi Kes
Alternatif Tanıları Düşün

24 saat sonra PCR tekrar

Negatif

Pozitif

COVID Tedavisine devam

Düzelmiş

İlerlemiş

Semptom başlangıcından 7
gün sonrasına kadar evde
izole takip edilir

Hastaneye çağrılarak
yatış ve test tekrarı açısından
yeniden değerlendirilir



Servis*

YBÜ'ne yatış kriterleri olan hastalar yoğun bakım ünitesine yatırılır.

BT**

Ateş + öksürük – Akciğer grafisi doğal: Kontrastsız düşük doz BT

Ateş + öksürük – Akciğer grafisi tanısal/tanısal değil: Kontrastsız düşük doz BT

Ateş + öksürük + komorbid hastalık veya Yaş>50 + tanısal olmayan akciğer grafisi:

Kontrastsız tam doz BT, başka bir hastalık nedeniyle endikasyon varsa kontrastlı BT çekilir

⚠ 20 yaş altındaki genç kadınlarda BT çekilmesinden kaçınılmalıdır.

⚠ Çapraz bulaşı önlemek için her hastadan sonra BT cihazı uygun şekilde temizlenmelidir.

¹Influenza testi negatif bulunan hastalarda kesilebilir

²Kardiyak aritmi öyküsü olan veya QT mesafesini uzatan ilaç kullanan kişilerde hidroksiklorokin başlanmadan önce EKG çekilmesi gerekir.

³Çocuk hastalarda klorokin sadece ağır olgularda kullanılır