

VİMİZİM (ELOSULFASE ALFA) KULLANIM VE ÖDEME ESASLARI

Mukopolisakkaridoz Tip IVA (Morque A Sendromu) hastalığının tedavisinde kullanılan Vimizim (Elosulfase alfa) 5mg/5ml 1 vial isimli ilacın kullanılması ve ödenebilmesi için ;

Periferik kandan veya dokudan enzim (N-asetilgalaktozamin 6-sülfataz) düzeyinin veya mutasyon analiz sonuçlarının hastalıkla uyumlu olmasına göre tanı konulmuş olmalıdır.

60 ay ve üzeri desteksiz yürüyebilen hastalarda; tanıya esas kriter/kriterlerin ve 6 dakika yürüme testi sonuçlarının belirtildiği, 3. Basamak Resmi Sağlık kuruluşlarında düzenlenen en az bir Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süreli Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak Çocuk Metabolizma Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Ortopedi ve Nöroloji Uzmanı tarafından reçete edilir.

TRANSLARNA (ATALUREN) KULLANIM VE ÖDEME ESASLARI

Duchenne Muskuler Distrofi hastalığı tedavisinde kullanılan Translarna(Ataluren) 250mg ve 1000 mg 30 saches isimli ilaçların kullanılması ve ödenmesi için;

Distrofin geninde nonsense (anlamsız) mutasyonlar olduğu genetik test (DNA analizi) ile ortaya konmuş olmalıdır.

60 ay ve üzeri desteksiz yürüyebilen hastalarda; tanıya esas kriter/kriterlerin ve 6 dakika yürüme testi sonuçlarının belirtildiği, 3. Basamak Resmi Sağlık kuruluşlarında düzenlenen en az bir Nöroloji Uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süreli Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak Nöroloji Uzmanı tarafından reçete edilir.